

**LA OTRA CARA DE LOS NAZIS EN EL SIGLO XXI:
HAN CAMBIADO SUS UNIFORMES POR TÚNICAS. PERO ¿DÓNDE ESTÁN, DE
DONDE VIENEN, QUÉ HACEN?**

El marketing de drogas para Pacientes Inapropiados

Los consejeros, aún como expertos de la Administración del Alimento y la Droga se preparan para tomar una mirada más cercana a una clase potencialmente arriesgada de analgésicos, los inhibidores de COX-2, ya que ha surgido la nueva evidencia perturbadora de que estas drogas han sido prescritas principalmente a pacientes que no las necesitan. Si un análisis publicado recientemente en The Archives of Internal Medicine concluye sobre la necesidad de averiguaciones adicionales, proporciona un ejemplo que dice de cómo una avalancha del marketing puede propulsar el uso de drogas nuevas más allá de la razón, ubicando a pacientes bajo riesgos innecesarios y en lo que ellos, no es probable, por lejos, de que puedan ayudar.

Los estudios clínicos muestran que los inhibidores de COX-2, como el Vioxx y el Celebrex, no son más efectivos como analgésicos, que muchas drogas sin receta y más viejas. Su ventaja presumida, es que ellos, se piensa, ofrecerán menos riesgos, tales como efectos gastrointestinales severos como úlceras o sangrado, que matan a millares de personas cada año. Desgraciadamente, las drogas pueden ofrecer también un riesgo cardiovascular. El Vioxx ha mostrado que es capaz de provocar un aumento pequeño en infartos o paros cardíacos por el uso prolongado, causando que el fabricante lo debiera retirar del mercado. La clase entera de drogas inhibidoras de COX-2 están ahora bajo revisión.

El drogas del grupo COX-2 fueron volcadas como granizo, inicialmente, como salvadores potenciales para una minoría pequeña de pacientes con el riesgo verdadero de efectos gastrointestinales fatales. Pero según investigadores en la Universidad de Chicago y Stanford, casi dos tercios de drogas del grupo COX-2 recetadas entre 1999 al 2002 fue a pacientes con un riesgo bajo o muy bajo de complicaciones gastrointestinales. Ellos no eran candidatos apropiados, bajo pautas profesionales de tratamiento, para consumirlas.

La investigación no mostró por qué el uso de este grupo, COX-2, se expandió indiscriminadamente, pero parece que hay pocas dudas de que la causa es esa publicidad intensa y las campañas promocionales que acosaron inevitablemente a muchos pacientes que no los debieron haber tomado. Verdaderamente, el crecimiento en el uso del grupo del COX-2, con el tiempo fué principalmente para los pacientes que menos probablemente iban a beneficiarse.

Dos grupos consultores de la Administración de Alimentos y Drogas se encontrarán a mediados de febrero para considerar una serie de estudios respecto a la seguridad y beneficios de las drogas COX-2 restantes. Algunos abogados de defensa del consumidor quieren una prohibición total de dicha clase, mientras otros expertos sugieren que no todas ellas ofrecen el mismo riesgo cardiovascular. La FDA. deberá escoger el permitir alguna droga del tipo COX-2 en el mercado, pero necesitarán encontrar las maneras de limitar su uso a los que sinceramente los necesitan.